

ROTULADO INMEDIATO

COMIRNATY™

Concentrado estéril – IM

Vacuna COVID-19mRNA

6 dosis después de la dilución descartar

Fecha/ hora:

Lote/Expira:

ROTULADO MEDIATO

COMIRNATY™

Concentrado para dispersión inyectable.

Vacuna COVID-19mRNA

Uso intramuscular después de la dilución

195 viales multidosis

(después de la dilución, cada vial contiene 6 dosis de 0.3 mL)

Almacenamiento: Antes de la dilución, almacenar entre -90 ° C y -60 ° C en el paquete original para proteger de la luz. Después de la dilución, almacene la vacuna entre 2 ° C y 30 ° C y utilícela dentro de las 6 horas. Deseche cualquier vacuna no utilizada.

Diluir antes de usar: diluir cada vial con 1,8 ml de cloruro de sodio de 9 mg / ml (0,9%)
Solución inyectable.

Lea el prospecto antes de usar.

Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, cloruro de potasio, dihidrogeno fosfato de potasio, cloruro de sodio, fosfato de disodio dihidrato, sacarosa, agua para inyectables.

BIONTECH /PFIZER

BioNTech Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 1255131 Mainz, Alemania.

Escanear código QR para más información
EU/1/20/1528

COMIRNATY™

Concentrado para dispersión inyectable.

Vacuna COVID-19mRNA

Uso intramuscular después de la dilución

195 viales multidosis

Antes de la dilución, almacenar entre -90 ° C y -60 ° C

LOT/EXP/SN