

ROTULADO MEDIATO

COMIRNATY™

adultos y adolescentes a partir de 12 años

Concentrado para dispersión inyectable

30 microgramos/dosis

Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleósido modificado)

Tozinameran

Uso intramuscular después de la dilución.

195 viales multidosis

(Después de la dilución, cada vial contiene **6 dosis de 0,3 ml**).

Almacenamiento: Antes de la dilución, almacenar entre -90° C a -60° C en el envase original para protegerlo de la luz. Después de la dilución, almacene la vacuna entre 2° C a 30° C y utilícela dentro de las 6 horas.

Diluir antes de usar: Diluir cada vial con 1,8 ml de solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%). Lea el inserto antes de usar.

Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, cloruro de potasio, Fosfato potásico monobásico, cloruro de sodio, Fosfato sódico dibásico dihidrato, sacarosa, agua para inyección, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico.

[Logo Biontech] [Logo Pfizer]

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Alemania

[Código QR]

Escanea el código QR para más información

EU/1/20/1528/001

COMIRNATY™

adultos y adolescentes a partir de 12 años

Concentrado para dispersión inyectable

30 microgramos/dosis

Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleósido modificado)

Diluir antes de usar

Fecha de caducidad de 2° C a 8° C:

(máximo 1 mes; tache la fecha de vencimiento anterior)

LOT/EXP (de -90° C a -60° C)/SN