

date:15-Oct-21 12:11:56

Process/543 7597 7671 Micro inks on file
 Black Varnish Writable Structure
 Varnish



OVERPRINT AREA

INLINE DM AREA

WRITABLE VARNISH!

itemnr.: PAA182622

formatcode: L565	BLACK P7671C	Item description BL-COMIRNATY VAC 195X GVL EU	Issue reason 2P2108320 TEXT + LAYOUT CHANGES
dimensions: 105mm x 130mm	P7543C		
date/initials: 15 oct 2021/SPEN	P7597C		
country: EU	Varnish		

ROTULADO MEDIATO

COMIRNATY™

adultos y adolescentes a partir de 12 años

Concentrado para dispersión inyectable

30 microgramos/dosis

Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleósido modificado)

Tozinameran

Uso intramuscular después de la dilución.

195 viales multidosis

(Después de la dilución, cada vial contiene **6 dosis de 0,3 ml**).

Almacenamiento: Antes de la dilución, almacenar entre -90°C a -60°C en el envase original para protegerlo de la luz. Después de la dilución, almacene la vacuna entre 2°C a 30°C y utilícela dentro de las 6 horas.

Diluir antes de usar: Diluir cada vial con 1,8 ml de solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%). Lea el inserto antes de usar.

Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, cloruro de potasio, Fosfato potásico monobásico, cloruro de sodio, Fosfato sódico dibásico dihidrato, sacarosa, agua para inyección, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico.

[Logo Biontech] [Logo Pfizer]

BioNTech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mainz, Alemania

[Código QR]

Escanea el código QR para más información

EU/1/20/1528/001

COMIRNATY™

adultos y adolescentes a partir de 12 años

Concentrado para dispersión inyectable

30 microgramos/dosis

Vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleósido modificado)

Diluir antes de usar

Fecha de caducidad de 2°C a 8°C:

(máximo 1 mes; tache la fecha de vencimiento anterior)

LOT/EXP (de -90°C a -60 °C)/SN