




Pfizer		Date: 09 Sep 2022	Time: 16:51	Colours	
Supplier N°	PAA195050	Market	EU-CRP	Printing	Non-Printing
Perigord N°	N/A	Proof N°	09	Black	Profile
Supplier	Puurs	Component	Folding Carton	PMS Cool Gray 9	WRITABLE VERSION
C128	PAA195050	Data matrix	PAA195050	PMS 7597	
Smallest BODY TEXT Size	9 pt	Drawing N°	K1029_05		
Dimensions	37 x 47 x 89 mm	Source Code	232		
Material Name	N/A				
PAR Number	PAR-2022-0006152				
Perigord life science artwork solutions		Telephone: +353 (0)1 440 3222 info@perigord-as.com - www.perigord-as.com			

The pantone colours are coated

COMIRNATY™

Adultos y adolescentes a partir de 12 años

Original/Omicron BA.4-5

dispersión inyectable

(15/15 microgramos)/dosis

Vacuna COVID-19 ARNm (nucleósido modificado)

Tozinameran/Famtozinameran

Uso intramuscular, **No diluir antes de usar.**

10 viales multidosis

Cada vial contiene 6 dosis de 0.3 mL.

Fecha de expiración a 2°C a 8°C:

(Máximo 10 semanas.

Tache la fecha de vencimiento anterior.)

PC:04260703260354

LOT/EXP (de -90 ° C a - 60 ° C)/SN:

COMIRNATY™

Original/Omicron BA.4-5

Adultos y adolescentes a partir de 12 años

(15/15 microgramos)/dosis

dispersión inyectable

No diluir antes de usar.

Almacenamiento: Almacenar entre 2°C a 8°C después de recibirlo. No vuelva a congelar una vez descongelada.

Consérvese en el embalaje original para protegerlo de la luz.

Lea el prospecto antes de usar y para obtener información adicional sobre conservación.

Después de la primera punción, almacenar entre 2 ° C y 30 ° C y usar dentro de las 12 horas.

Código QR

Escanee el código QR para más información

EU/1/20/1528/008

Una dosis contiene 15 microgramos de tozinameran y 15 microgramos de famtozinameran.

-Excipientes: ALC-0315, ALC-0159, DSPC, colesterol, trometamol, clorhidrato de trometamol, sucrosa, agua para inyección.

BioNtech/Pfizer

BioNtech Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12, 55131

Mainz, Alemania

PAA195050